



환자용 사용설명서

브릴렉트정 10, 25, 50, 100 밀리그램(브리바라세탐)

본 설명서는 브릴렉트의 안전하고 정확한 사용을 위해서 환자에게 제공됩니다. 이 설명서에는 중요한 정보가 포함되어 있으므로, 이 약을 복용하시기 전에 내용을 잘 읽어주세요.

- 이 설명서는 다시 읽어야 할 수도 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.
- 이 약에 대해 궁금한 사항이 있는 경우, 의사 또는 약사에게 문의하세요.
- 이 약은 귀하에게 처방되었으므로 다른 사람에게 주지 마세요. 병의 증세가 귀하와 같더라도 해를 입힐 수 있습니다.
- 부작용이 발생했을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하세요. 이 설명서에 적혀 있지 않은 부작용이 발생한 경우에도 마찬가지로입니다.

1

브릴렉트는 어떤 약이며 어느 질환에 사용되나요?

브릴렉트는 어떤 약인가요?

브릴렉트는 브리바라세탐이라는 성분의 뇌전증 치료제로 발작의 치료를 위해서 사용됩니다.

브릴렉트는 어떤 질환에 사용되나요?

- 브릴렉트는 성인 및 16세 이상의 청소년에게 사용됩니다.
- 이차성 전신 발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분 발작을 치료하는데 사용됩니다.
- 부분 발작은 뇌의 한쪽에만 영향을 미치는 발작입니다. 이러한 부분 발작은 뇌 양쪽의 더 넓은 영역으로 퍼져 확장될 수 있으며, 이를 '이차성 전신 발작'이라고 합니다.
- 귀하는 발작의 횟수를 줄이기 위해 이 약을 처방 받았습니니다.
- 브릴렉트는 다른 뇌전증 치료제와 함께 사용됩니다.

2

브릴렉트를 복용하시기 전에 알아야 할 점

다음의 경우에는 브릴렉트를 복용하지 마세요.

- 브리바라세탐 또는 레베티라세탐, 피라세탐과 같은 피롤리돈 유도체, 또는 이 약의 다른 성분에 알레르기가 있는 경우, 확실하지 않은 경우에는 브릴렉트를 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하세요.
- 브릴렉트를 복용한 후 심한 피부 발진, 피부 벗겨짐, 물집, 구내염이 발생한 적이 있는 경우. 브릴렉트와 관련하여 스티븐스-존슨 증후군을 포함한 심각한 피부 반응이 보고되었습니다. 심각한 피부 반응과 관련된 증상이 나타나면 브릴렉트의 사용을 중단하고 즉시 의사의 진료를 받으세요.

경고 및 주의사항

다음의 경우에는 브릴렉트 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하세요.

- 자해 또는 자살 충동이 있는 경우. 항뇌전증약을 복용한 환자들 중 소수에서 자해 또는 자살 충동을 경험했습니다. 이러한 생각이 드는 경우 즉시 의사에게 연락하세요.
- 간 질환이 있는 경우 의사가 복용량을 조절해야 할 수 있습니다.

소아청소년

브릴렉트는 16세 미만의 어린이 및 청소년에게는 권장되지 않습니다.

다른 의약품을 같이 복용하는 경우

다른 의약품을 복용 중이거나, 최근에 복용했거나, 앞으로 복용할 가능성이 있는 경우, 의사 또는 약사에게 말씀해 주세요. 특히 다음 의약품을 복용 중인 경우에는 의사에게 알려야 하며, 의사가 브릴렉트의 복용량을 조절해야 할 수 있습니다.

- 리팜피신: 세균 감염의 치료에 사용되는 약물.
- 세인트존스워트(St John's wort; 서양고추나물 *Hypericum perforatum* 이라고도 함): 우울증과 불안을 비롯한 기타 질환 치료에 사용되는 생약.

술(알코올)을 같이 복용하는 경우

- 이 약과 술(알코올)을 같이 복용하는 것은 권장되지 않습니다.
- 브릴렉트 복용 중 술(알코올)을 섭취하면 술(알코올)의 부작용이 증가할 수 있습니다.

임신 및 수유

가임기 여성은 의사와 피임에 대해서 상담해야 합니다. 임신 중이거나 모유 수유 중이거나, 임신 가능성이 있거나 임신을 계획하고 있다면 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하세요. 임신 중이라면 브릴렉트의 복용을 권장하지 않습니다. 브릴렉트가 임신 및 태아에 미치는 영향은 알려져 있지 않습니다. 브릴렉트의 복용 중에는 모유 수유가 권장되지 않습니다. 브릴렉트는 모유로 분비되기 때문입니다. 의사와 상의 없이 치료를 중단하지 마세요. 치료를 중단하면 발작이 증가하고 태아에게 해로울 수 있습니다.

운전 및 기계 조작

브릴렉트 복용 중 졸음, 현기증 또는 피로감을 느낄 수 있습니다. 이러한 증상은 치료 시작 시 또는 용량 증량 후 더 자주 나타날 수 있습니다. 이 약의 영향에 익숙해질 때까지는 운전, 자전거 타기, 도구 또는 기계 작동을 하지 마세요.

브릴렉트의 유당

브릴렉트에는 유당(당의 일종)이 함유되어 있습니다. 의사로부터 특정 당에 대한 불내증이 있다는 진단을 받은 경우, 이 약을 복용하기 전에 의사와 상의하세요.

3

브릴렉트를 복용하는 방법

항상 의사의 지시대로 정확하게 복용하세요. 복용 방법이 확실하지 않은 경우 의사나 약사와 상의하세요. 특정 환자에게는 다른 형태의 약이 더 적합할 수 있으며(예: 정제를 통째로 삼킬 수 없는 경우), 이런 경우 의사나 약사와 상의하세요. 브릴렉트는 다른 뇌전증 치료제와 함께 복용합니다.

복용량

의사가 귀하에게 적합한 하루 복용량을 알려줄 것 입니다.
하루 복용량을 동일한 양으로 나눠서 약 12 시간 간격으로
복용합니다.

- 권장 복용량은 1회 25mg에서 100mg을 하루에 두 번 복용하는
것입니다. 의사는 귀하에게 가장 적합한 복용량을 찾기 위해서
용량을 조절할 수 있습니다.
- 간 질환이 있는 경우 이 약의 노출이 증가합니다. 처음에는 1회
25mg씩 하루에 두 번 복용하고, 최대 1회 75mg씩 하루에 두 번
복용하는 것이 권장됩니다.
- 신장 질환이 있는 경우에는 복용량을 조절할 필요가 없습니다.
이 약은 혈액투석을 받고 있는 말기 신장애 환자에게 권장되지
않습니다.
- 65세 이상의 고령자인 경우에도 복용량을 조절할 필요가
없습니다. 65세 이상의 고령환자에게 임상 경험은
제한적입니다.

브릴렉트 정제 복용 방법

- 정제를 물 한 컵과 함께 통째로 삼키세요.
- 이 약은 음식과 함께 또는 음식 없이 복용할 수 있습니다.

브릴렉트 복용 기간

의사의 중단 지시가 있을 때까지 브릴렉트를 계속 복용하세요.
이 약의 장기 투여 안전성은 확립되어 있지 않습니다.

브릴렉트를 더 많이 복용한 경우

브릴렉트를 정해진 복용량보다 더 많이 복용한 경우 의사와
상의하세요. 어지러움증과 졸음이 올 수 있고, 메스꺼움, 어지러움,
균형 감각 저하, 불안, 심한 피로감, 과민성, 공격적 행동, 불면증,
우울증, 자해 또는 자살 시도 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

브릴렉트의 복용을 잊은 경우

- 복용을 잊은 경우에는 기억난 즉시 복용하세요.
- 다음 복용은 평소 복용하던 시간(이후 돌아오는 아침 또는 저녁)에 복용하세요.
- 잊어버린 양을 메우기 위해 2회분의 약을 한꺼번에 복용하지 마세요.
- 어떻게 해야 할지 확실하지 않으면 의사나 약사에게 문의하세요.

브릴렉트의 복용을 중단할 경우

- 의사의 지시가 없는 한 이 약의 복용을 중단하지 마세요.
- 의사가 이 약의 복용 중단을 권고하는 경우, 복용량을 서서히 줄일 것입니다. 이는 발작이 재발하거나 악화되는 것을 막는 데 도움이 됩니다.
- 권장 방법은 1주 간격으로 1일 50mg 씩 점차적으로 감량하고, 중단 2주전에는 일주일간 1일 50mg을 투여하고, 마지막 일주일간 1일 20mg을 투여합니다.

이 약의 복용에 대해 다른 질문이 있으면
의사나 약사에게 문의하세요.

4

발생 가능한 부작용

다른 의약품처럼 이 약도 부작용을 일으킬 수 있으나,
모든 환자들이 겪는 것은 아닙니다.

매우 흔한 부작용 (10명 중 1명 이상에게 나타날 수 있음)

- 졸음 또는 현기증

흔한 부작용(100명 중 1명 이상에게 나타날 수 있음)

- 독감
- 심한 피로감
- 경련, 어지러움(현기증)
- 메스꺼움 및 구토, 변비
- 우울증, 불안, 불면증, 과민함
- 코와 목 감염(감기 등), 기침
- 식욕 감소

흔하지 않은 부작용(1000명 중 1명 이상에게 나타날 수 있음)

- 알레르기 반응
- 비정상적인 사고 또는 현실 감각 상실(정신병적 장애), 공격성, 신경 흥분(초조)
- 자해 또는 자살 생각 또는 시도: 즉시 의사에게 알려주세요.
- 혈액 검사 결과 백혈구 감소(호중구 감소증)

알려지지 않은 부작용(이용 가능한 데이터에서 빈도를 추정할 수 없음)

- 물집과 벗겨지는 피부를 동반한 광범위한 발진, 특히 입 주변, 코, 눈, 생식기(스티븐스-존슨 증후군)

5

브릴렉트의 보관 방법

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
표시된 유효기간 이후에는 이 약을 복용하지 마십시오.
이 약은 특별한 보관 조건이 필요하지 않으며,
실내(온도1~30°C)에 보관하시면 됩니다.

브릴렉트정 10밀리그램(브리바라세탐)

- 주성분: 브리바라세탐 10mg
- 첨가제: 유당수화물, 오파드라이 II 흰색(85F18422),
크로스카르멜로오스나트륨, 무수유당,
스테아르산마그네슘, 베타덱스
- 성상: 흰색의 원형 필름코팅정

브릴렉트정 25밀리그램(브리바라세탐)

- 주성분: 브리바라세탐 25mg
- 첨가제: 유당수화물, 오파드라이 II 회색(85F275014),
크로스카르멜로오스나트륨, 무수유당,
스테아르산마그네슘, 베타덱스
- 성상: 회색의 타원형 필름코팅정

브릴렉트정 50밀리그램(브리바라세탐)

- 주성분: 브리바라세탐 50mg
- 첨가제: 유당수화물, 오파드라이 II 노란색(85F38197),
크로스카르멜로오스나트륨, 무수유당,
스테아르산마그네슘, 베타덱스
- 성상: 노란색의 타원형 필름코팅정

브릴렉트정 100밀리그램(브리바라세탐)

- 주성분: 브리바라세탐 100mg
- 첨가제: 유당수화물, 오파드라이 II 황갈색(85F270000),
크로스카르멜로오스나트륨, 무수유당,
스테아르산마그네슘, 베타덱스
- 성상: 회녹색의 타원형 필름코팅정

제조판매원: 현대약품(주) 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

제품문의처: Tel. 1666-9979

사용설명서 재·개정일: 2025.10.15

* 이 사용설명서의 개정연월일(2025년 10월 15일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주)

홈페이지(<http://www.hyundapharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

* 이 환자용 사용설명서는 식품의약품안전처의 검토를 받았습니다.